臺灣菸酒股份有限公司 109 年從業職員及從業評價職位人員甄試試題

甄試類別【代碼】:從業評價職位人員/護理【Q2726】、護理(身心障礙組)【Q2905】 專業科目 1: 護理學概要 *入場通知書編號:

- 注意:①作答前先檢查答案卡,測驗入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符,如有不同應立即請 監試人員處理。使用非本人答案卡作答者,該節不予計分。
 - ②本試卷一張雙面,四選一單選選擇題共50題,每題2分,共100分。限用2B鉛筆在「答案卡上作答,請選出一個正確或最適當答案,答錯不倒扣;以複選作答或未作答者,該題不予計分。
 - ③請勿於答案卡書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
 - ④本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內建程式、外接插卡、攝(錄)影音、資料傳輸、通訊或類似功能),且不得發出聲響。應考人如有下列情事扣該節成績 10 分,如再犯者該節不予計分。1.電子計算器發出聲響,經制止仍執意續犯者。2.將不符規定之電子計算器置於桌面或使用,經制止仍執意續犯者。
 - ⑤答案卡務必繳回,違反者該節成績以零分計算。
- 【1】1.有關新型冠狀病毒(COVID-19)自我防護措施,下列何者錯誤?
- ①多喝熱水
- ②咳嗽戴口罩
- ③用肥皂勤洗手
- ④少去醫院及人多場所
- 【4】2.有關健康的敘述,下列何者正確?
- ①健康是持續性靜態的
- ②健康與疾病是絕對的關係
- ③健康與疾病是非連續性過程
- ④健康與疾病間無明顯的分界
- 【3】3.提供足夠醫療資訊給病人,讓病人自己做決定,是屬於下列何種倫理原則?
- ①施益原則
- ②誠實原則
- ③自主原則
- ④保密原則
- 【3】4.護理師對病人說:「你今天跟平常不一樣,你今天是自己舖床而且很整齊」,此護理師是使用下列何種溝通技巧?
- ①提供訊息
- ②透露感受
- ③給予確認
- ④陳述真實狀況
- 【1】5.憂鬱症的病人最常使用下列何種心理防衛機轉(defense mechanism)?
- ①內射作用
- ②認同作用
- ③合理化

④投射作用

- 【3】6.偏遠地區之醫療資源較不足,為達全民均健的目標,在偏遠地區之重要健康保健策略應為何?
- ①醫院醫療
- ②急重症醫療
- ③基層醫療保健
- ④專科醫療
- 【1】7.細菌性食物中毒,以下列何者致死率最高?
- ①肉毒桿菌
- ②金黃色葡萄球菌
- ③沙門氏菌
- ④黃麴黴菌
- 【4】8.有關護理記錄的書寫方法,下列敘述何者錯誤?
- ①「注意傷口之變化」屬於焦點式記錄法(DART)中的「A」
- ②「疼痛/因手術傷口造成」屬於問題為導向記錄(SOAP)中的「A」
- ③「傷口好痛」屬於問題為導向記錄(SOAP)中的「S」
- ④「教導個案早期下床活動」屬於焦點式記錄法(DART)中的「R」
- 【1】9.下列何者不屬於外科無菌技術的適應症?
- ①鼻胃灌食
- ②導尿技術
- ③靜脈注射
- ④手術傷口換藥

【1】10.有關降低輻射對人體傷害的防護三原則,不包含下列何者?

①空間 ②時間 ③距離 【3】11.下列何種醫療廢棄物應採滅菌後粉碎處理?

- ①手術用手套
- ②靜脈輸液軟袋
- ③手術縫合針
- ④沾血或膿的紗布
- 【1】12.有關舖床時工作人員之身體姿勢運用,下列敘述何者正確?
- ①雙腳分開加大底部面積
- ②可彎曲腰部來擴大工作範圍
- ③多運用肩部力量減少疲乏
- ④利用小肌肉會較省力
- 【2】13.皮下注射時的注射角度會受下列何項因素的影響?
- ①性別
- ②使用之注射針頭
- ③藥物為油性或水性
- ④藥物之注射劑量
- 【3】14.「Atropine 2 mg I.M. before sent patient to OR」此屬於下列何類醫屬?
- ①及時給與醫囑
- ②視需要醫囑
- ③單次醫囑
- ④如有需要時,給與一次醫囑
- 【4】15.新型冠狀病毒(COVID-19)係屬第幾類法定傳染病?

第一類 ②第二類

【2】16.依據疾病管制署統計,區域醫院院內感染部位以下列何種部位發生率最高?

- ①血流感染
- ②泌尿道感染
- ③肺炎
- ④傷□感染
- 【4】17.下列何種情況下,病人的糞便顏色可能是白色的?
- ①食用過多甜菜
- ②陽道感染
- ③上陽胃道出血
- ④ 膽道阳寒
- 【3】18.一位年輕人因運動扭傷踝關節,立即採用冰敷患部,此時冰敷主要作用機轉為何?
- ①增加吞噬細胞之作用
- ②增加咸覺神經傳導
- ③降低微血管之通透性
- @降低血小板凝集之作用
- 【4】19.收縮壓為何處對血管壁所造成的壓力?
- ①右心房
- ②右心室

③左心房

③第四類

【2】20.蔡小姐因急性胰臟炎漸緩解,醫囑移除鼻胃管,並開立由口進食飲食,護理師認為下列何種飲食種

④左心室

④鉛板

④第五類

- 12120·奈小姐囚忌住陇臧火州级胜,曹蠋侈际异自自,业用立田口建良跃良,设理即心局于外門俚跃良恒 類較適合?
- ①低普林飲食
- ②低油飲食
- ③高鉀飲食
- ④低蛋白飲食
- 【1】21.血液檢體收集後,應將用過的棉籤依下列何種廢棄物規定處理?
- ①感染性可燃
- ②一般性可燃
- ③ 咸染性不可燃
- ④一般性不可燃
- 【4】22.有關瀕死個案的生理、知覺變化,下列何者錯誤?
- ①語言表達逐漸模糊
- ②可能會有聽幻覺
- ③定向感混亂,可能會與已過世的人互動
- ④口腔分泌物增加,造成吞嚥困難

【請接續背面】

[2] 23.當病人以柺杖輔具以三點式步態行走時,肩關節正執行下列哪	些關節的部分活動? A.外旋 B.	
屈曲	④僅 CD	①體重過重:27≦BMI<30 ②正常範圍:18.5≦BMI<24
(3】24.臨終病患最後消失的感覺功能為何?①視覺 ②觸覺 ③聽覺	④嗅覺	③重度肥胖:BMI≥40 ④輕度肥胖:20≤BMI<30
[3] 25.高血壓病患服用何種藥物要特別注意血壓上升的變化?		【1或2】40.有關簡易傷口護理的敘述,下列何者錯誤? ①執行傷口消毒的方式是由傷口外側到傷口內側
①硝化甘油 ②鎮靜劑 ③動情素 【1】26.高血壓病人測量脈搏時,較可能會出現下列何種異常脈動?	④利尿劑	②有渗液的傷口蓋厚敷料,不用經常換藥
①洪脈 ②交替脈 ③絲脈	④弦脈	③同時有乾淨及污染的傷口時,應先更換乾淨的傷口 ②執行復口消毒節團無去於復口期團 2 公公以上
[2】27.下列何種濃度的酒精殺菌效果最佳? ① 95%酒精 ② 75%酒精 ③ 50%酒精	④ 33%酒精	●執行傷□消毒範圍要大於傷□周圍2公分以上【2】41. WHO 高齡友善城市八大面向不包括下列何者?
[1] 28.「有效的洗手」能暫時清除手部大約多少比率的細菌?		①社區及健康服務
	④ 60% 可種 區次 ?	②機構安全 ③工作與志願服務
①安全感的需要 ②自尊及自重的需要 ③愛及歸屬感的需要	④自我實現的需要	④無障礙的公共空間 【2】 42 概点 [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
【1】30.醫療場所發生火災時的應變守則可遵循 RACE 原則,下列敘述 ① R:reduce(降低)	何者錯誤?	【3】42.顱內壓上升的病人,其生命徵象的變化為何? ①心搏過速、呼吸過慢、血壓下降
② A:alarm(通報)		②心搏過速、呼吸過慢、血壓上升
③ C: contain (侷限火勢)		③心搏過緩、呼吸過慢、血壓上升 ④心搏過速、呼吸過速、血壓上升
④ E:extinguish(滅火) 【3】31.不同性質的人際互動會有不同的安全距離,下列敘述何者正確:	?	【1】43.巴金森氏症病人的基底核會產生退化性改變,使得 Dopamine 的分泌减少,下列何者不是其症狀?
①與病人討論溝通的距離為社交的距離 120~360 公分		①活動性顫抖 ②僵硬
②演講或教師講課的距離為社交的距離 120~360 公分 ③一般性的社交活動的距離為社交的距離 120~360 公分		③運動遲緩
④親密的距離 45~120 公分是私下交談的距離		④面具臉 【4】44.有關病毒性肝炎之敘述,下列何者錯誤?
【2】32.有關常見去除汙漬清洗劑的敘述,下列何者錯誤? ①新污染的血漬:冷水		① A 型肝炎常見的傳染途徑是糞便污染食物或飲水由口經腸感染
②排泄物及分泌物: 0.1%漂白水		② B 型肝炎常見的傳染途徑是血液或體液感染 ③慢性 B 型肝炎及 C 型肝炎可能與肝癌有關
③新污染的血漬:過氧化氫溶液 ④膠布痕跡:乙醚		④ C 型肝炎的傳染有 1/3~1/2 是經過母親垂直傳染
【3】33.有關醫療人員洗手五時機,不包括下列何者?		【3】45.有關良性腫瘤與惡性腫瘤特徵之比較,下列何者錯誤? ①惡性腫瘤的成長型式會擴散侵襲周圍組織
①接觸病人前後		②良性腫瘤的細胞分化良好,與原組織相似
②暴露病人體液風險後 ③接觸病人周遭環境前		③良性腫瘤的生長速度通常很迅速 ④惡性腫瘤常發生轉移
④執行操作技術前		【4】46.免疫細胞中的顆粒性白血球,不包括下列何者?
[1] 34.仰臥時,壓傷的好發部位為何?①局胛骨 ②大粗隆 ③内外髁	④踝部	①嗜中性球 ②嗜鹼性球 ③嗜酸性球 ④單核球 【2】47.給與病人咳嗽藥物:cough mixture 15 c.c. P.O.時,下列何種給藥護理措施適當?
[3] 35.有關脂溶性維生素的敘述,下列何者錯誤?	S. L. F.	①服藥前 30 分鐘,應禁止病人喝水
①維生素 A 缺乏時易罹患夜盲症 ②維生素 D 以 D3 是最重要的,可以維持體內鈣與磷的恆定		②服用此藥時,不要與開水同服
③維生素 E 缺乏易引起軟骨症		③服藥後 10 分鐘內,病人應多喝開水 ④藥物可以混合於熱開水 15 c.c.一起服用
④維生素 K 是構成凝血酶原所必須的一種物質【2】36.有關影響血壓的因素,下列敘述何者錯誤?		【3】48.有關全身適應症候群(general adaptation syndrome)之敘述,下列何者錯誤?
①年齡越高,動脈管壁彈性下降,血液黏稠度上升,血流阻力加大,	故血壓比較高	①分成警覺期、抵抗期及耗竭期 ②警覺期時,正腎上腺素分泌增加,心跳加快
②平躺時的血壓高於坐姿血壓,坐姿血壓高於站立時的血壓 ③早晨起床血壓最低,受新陳代謝的影響,在午後或傍晚時達最高點		③抵抗期時,正腎上腺素分泌恢復正常,使個體準備適應壓力源
①中辰起床血壓取低,交机床下砌口影響。在下後或房塊時運取問點②由於尼古丁作用使血管收縮,所以抽菸會使血壓上升		④耗竭期時,身體可能出現如心律不整、高血壓、消化性潰瘍等症狀【1】49.有關睡眠各週期之腦波圖之敘述,下列何者正確?
【3】37.有關疾病的飲食治療,下列何者錯誤? ①低普林飲食:高尿酸血症		①快速動眼期〈REM〉,出現β波
②高蛋白飲食:外傷、高燒及感染者		②非快速動眼期第一期〈NREM I〉,出現θ波 ③非快速動眼期第二期〈NREM Π〉,出現α波
③低蛋白飲食:慢性肝炎、腎結石		④占睡眠總時數最多的是快速動眼期〈REM〉
④低油飲食:胰臟炎、膽結石 【1】38.有關成人糖尿病的治療目標,下列何者正確?		【4】50.有關尿失禁之敘述,下列何者錯誤? ①急迫性尿失禁是病人會突然有強烈的排尿慾望,來不及控制而尿液不由自主排出
①糖化血色素〈HbA1C〉<7.0%		②壓力性尿失禁是因骨盆底肌肉組織無力,常在咳嗽、大笑或打噴嚏時排出尿液
②飯前血糖 100~140mg/dl ③飯後 1~2 小時血糖 > 160mg/dl		③滿溢性尿失禁是因膀胱過度膨脹,造成不自主尿液排出 ④約有五成的尿失禁屬於反射性尿失禁
④身體質量指數〈BMI〉20.5~26 kg/m²		