

中華郵政股份有限公司 110 年職階人員甄試試題

職階／甄選類科【代碼】：專業職(二)內勤／護理人員【S0338】

第三節／專業科目(1)：基本護理學

*入場通知書編號：_____

注意：①作答前先檢查答案卡，測驗入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡作答者，該節不予計分。
②本試卷一張雙面，四選一單選擇題共 50 題，每題 2 分，共 100 分。限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，請選出一個正確或最適當答案，答錯不倒扣；以複選作答或未作答者，該題不予計分。
③請勿於答案卡書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
④本項測驗僅得使用簡易型電子計算器（不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內建程式、外接插卡、攝（錄）影音、資料傳輸、通訊或類似功能），且不得發出聲響。應考人如有下列情事扣該節成績 10 分，如再犯者該節不予計分。1.電子計算器發出聲響，經制止仍執意續犯者。2.將不符規定之電子計算器置於桌面或使用，經制止仍執意續犯者。
⑤答案卡務必繳回，違反者該節成績以零分計算。

【3】1.有關隔離衣，下列敘述何者正確？

- ①可選擇覆蓋至腰部的隔離衣
- ②脫隔離衣時領口視為汙染範圍
- ③脫下隔離衣應將汙染區包在裡面
- ④穿上隔離衣背後應視為汙染範圍

【4】2.若足部大拇指蒼白冰冷無血色，評估其血循時應測量何處脈搏較適宜？

- ①膝臑動脈
- ②股動脈
- ③腓動脈
- ④足背動脈

【4】3.當身體體液過少（脫水）時會出現下列何種症狀？

- ①尿量增加
- ②血壓上升
- ③靜脈血管充盈
- ④體溫升高

【3】4.有關異常糞便顏色可能原因，下列敘述何者正確？

- ①綠色糞便疑似腸道腫瘤
- ②黑便可能是下腸胃道出血
- ③糞便出現黏液可能是炎症反應
- ④灰白色糞便可能是大腸癌引起

【1】5.有關疾病所採取的隔離方式，下列敘述何者錯誤？

- ①照顧疥瘡病人要戴口罩及護目鏡
- ②開放性肺結核患者應住在負壓隔離病房
- ③照顧 HIV 帶原者採標準防護措施即可
- ④接觸德國麻疹病患應戴口罩

【2】6.長期臥床容易發生肌肉萎縮，應如何預防？

- ①維持舒適的半坐臥姿勢
- ②定時給予翻身及關節活動
- ③給予固定板支托固定關節
- ④給予藥物（肌肉鬆弛劑）

【3】7.下列何者不是熱療法的禁忌症？

- ①牙齒或耳朵發炎
- ②裝置心律調節器者
- ③慢性下背痛或經痛
- ④不明原因腹痛

【1】8.下列何者是醫院常見的化學性傷害？

- ①給藥錯誤
- ②跌倒
- ③嗆傷
- ④聽力傷害

【2】9.護理人員在照顧糖尿病左腳截肢臥床病患時，執行何項技術須採外科無菌方式？ A.殘肢包紮 B.會陰沖洗 C.傷口換藥 D.胰島素注射

- ①僅 AB
- ②僅 CD
- ③僅 AD
- ④僅 BC

【1】10.依據沙奇曼(Suchman)疾病分期的第三階段—接觸醫療照顧期，有關此期病人行為反應，下列敘述何者正確？

- ①會積極尋求醫療資源，以確定其生病角色
- ②關心疾病進展，接受生病角色
- ③因為害怕及焦慮，否認疾病症狀
- ④此階段的護理重點應避免和病人討論病情和治療方針

【4】11.個案腹痛嚴重，護理師進行評估與觀察，下列何者屬於間接觀察？

- ①觀察個案糞便顏色及形狀
- ②以聽診器聽腸蠕動聲音
- ③詢問腹痛性質
- ④查看糞便培養檢查結果

【4】12.執行護理活動前須觀察個案徵象(sign)與症狀(symptom)，下列敘述何者正確？

- ①個案說：我肚子脹脹的，是一種徵象
- ②觀察到個案臉色潮紅是徵象
- ③聽診個案心尖脈 72 次／分是症狀
- ④測得血壓 110/76mmHg 是徵象

【1】13.下列何種型態的健康問題應最優先處理？

- ①睡眠紊亂
- ②活動不足
- ③知識缺失
- ④角色關係

【2】14.執行按摩時應注意哪些原則？ A.使用潤滑劑減少摩擦 B.摩擦力越大血循越好越舒適 C.注意個案隱私 D.雙手清潔乾燥可戴清潔手套

- ①僅 BC
- ②僅 AC
- ③僅 AD
- ④僅 CD

【3】15.個案入院後護理師可尊稱個案某先生或某小姐，發藥時應該如何稱呼較恰當？

- ①維持尊稱個案某先生或某小姐
- ②以床號或病歷號稱呼個案
- ③請個案自己說出自己全名核對
- ④可使用個案常用的暱稱

【3】16.發燒開始期會出現下列何種症狀？

- ①肌肉放鬆
- ②新陳代謝變慢
- ③血管收縮
- ④臉色發紅

【3】17.有關用「冷」的注意事項，下列敘述何者錯誤？

- ①應隨時觀察局部膚色及血循
- ②適用於外傷 48 小時內，有消腫、止痛和止血作用
- ③使用時間以 2 小時為限，持續使用中間應休息 30-60 分鐘
- ④局部有蒼白或麻木感時需停止

【2】18.長期臥床固定不動，其骨質密度會出現下列何種變化？

- ①高骨密度，高血鈣
- ②低骨密度，高血鈣
- ③低骨密度，低血鈣
- ④高骨密度，低血鈣

【1】19.下列何者適用於手肘、膝蓋及腳踝的包紮？

- ① 8 字形包紮法
- ②螺旋回返形包紮法
- ③回返摺形包紮法
- ④人字形包紮法

【3】20.病人因跌倒造成左大腿骨折劇烈疼痛，入院時護理師應該優先執行下列何項護理措施？

- ①測量體重及生命徵象
- ②詢問過去日常作息情形
- ③維持舒適，減輕疼痛
- ④評估有無藥物過敏

【2】21.有關用藥的劑量，下列敘述何者錯誤？

- ①給藥途徑吸收越快的，所需的劑量愈低
- ②腎疾病會使藥物吸收力差，用藥劑量應增加
- ③老年人因新陳代謝降低，用藥劑量應減少
- ④體重和藥物劑量成正比

【4】22.協助病人灌腸時應採下列哪一種姿勢？

- ①屈膝仰臥式
- ②膝胸臥式
- ③膀胱截石術臥式
- ④左側臥式

【3】23.醫院中哪些物品不屬於感染性廢棄物？

- ①蓄尿袋
- ②清潔手套
- ③頸圈
- ④氧氣導管

【4】24.下列何者屬於院內感染？ A.入院一星期血液報告有 B 型肝炎 B.住院開刀之傷口化膿 C.入院時足部傷口出現膿性分泌物 D.靜脈留置針部位有化膿

- ①僅 AC
- ②僅 AD
- ③僅 BC
- ④僅 BD

【2】25.有關評估約束病人採 C.T.M.S.原則，下列敘述何者錯誤？

- ①「C」代表肢體的顏色
- ②「T」代表肢體的觀察時間
- ③「M」代表肢體的活動
- ④「S」代表肢體的感覺

【請接續背面】

【2】26.有關護理師依醫囑給予病人連續性管灌食以補充營養，下列敘述何者錯誤？

- ①灌食期間須維持半坐臥式
- ②若採胃灌食流速約為 80~120c.c./小時
- ③適用於只能容忍少量食物之個案
- ④可利用重力引流，或使用灌食幫浦緩慢灌入胃中

【2】27.鼓勵家屬陪伴及探視住院病人，是滿足 Maslow 需要階層的哪方面需求？

- ①生理的需求
- ②愛與歸屬感
- ③自尊的需求
- ④自我實現的需求

【1】28.有關醫療廢棄物處理，下列敘述何者錯誤？

- ①有害事業廢棄物中，可燃者以紅色垃圾袋盛裝，採掩埋法處理
- ②有害事業廢棄物中，不可燃者以黃色垃圾袋盛裝，以滅菌法處理
- ③一般事業廢棄物中，廢石膏模採焚化及掩埋
- ④病人訪客所產生的垃圾以白色透明塑膠袋收集

【3】29.臨床上一般身體檢查的順序為何？

- ①視→聽→叩→觸
- ②視→觸→聽→叩
- ③視→觸→叩→聽
- ④視→叩→聽→觸

【3】30.有關個體距離，下列敘述何者錯誤？

- ① 0~45 公分為親密距離，如親子、伴侶的距離
- ② 45~120 公分為個人距離，與病人溝通事情時的距離
- ③ 120~360 公分為公眾距離，是公開演講的距離
- ④ 120~360 公分為社交距離，是同事或一般性社交活動的距離

【1】31.有關護理人員在醫護照護相關感染的預防措施，下列敘述何者錯誤？

- ①給予病人預防性的抗生素
- ②能依洗手五時機確實洗手
- ③密切觀察
- ④確實執行無菌技術

【3】32.有關護理過程收集資料，下列敘述何者正確？

- ①護理人員觀察所收集的資料是主觀資料
- ②家屬及有意義他人所提供的資料是客觀資料
- ③視、聽、嗅、觸等獲得的資料是客觀資料
- ④心跳 100 次/分，屬於主觀資料

【4】33.口腔潰瘍及疼痛病人，在選擇漱口水時，下列何者為其優先選擇？

- ①耐斯特淨溶液
- ②溫開水
- ③麻醉劑溶液
- ④生理食鹽水

【2】34.執行床上沐浴時應注意的事項，下列何者不合適？

- ①用毛巾擦拭眼睛，應由內眥往外眥擦拭
- ②擦拭肢體由肢體的近心端往遠心端擦拭，避免水腫
- ③水溫 41~43°C
- ④離開病人單位，需要拉起床欄

【2】35.張先生，身高 175 公分、體重 78 公斤，其 BMI 是多少？屬於哪一種範圍？

- ① BMI 23.5；正常範圍
- ② BMI 25.5；體重過重
- ③ BMI 25.5；正常範圍
- ④ BMI 27；體重過重

【4】36.眼滴入法(eye instillation)是要將藥物滴入下列何者？

- ①角膜
- ②虹膜
- ③上結膜囊內
- ④眼結膜下穹窿處

【1】37.有關新入院病人的常規檢體收集，下列敘述何者正確？

- ①常規尿液檢查須採中段尿液檢查
- ②痰液檢查是收集病人晨起漱口後的第一口痰
- ③常規尿液檢查採集後，可放於室溫下，二小時內送檢
- ④尿液培養是以無菌方式取中段尿於無菌標本容器中，並於 60 分鐘內送檢，否則應放入冰箱暫存

【1】38.測量體溫時，依照測量的部位不同，所得的體溫數值高低而有所差異，何者的敘述正確？

- ①肛溫 > 耳溫 > 口溫 > 腋溫 > 額溫
- ②耳溫 > 肛溫 > 口溫 > 腋溫 > 額溫
- ③肛溫 > 口溫 > 耳溫 > 腋溫 > 額溫
- ④口溫 > 肛溫 > 耳溫 > 腋溫 > 額溫

【1】39.在病人安全中，有關放射線傷害的輻射防護三原則，下列何者非屬之？

- ①次數
- ②時間
- ③距離
- ④屏蔽

【2】40.有關協助病人穿脫衣服，下列敘述何者錯誤？

- ①脫衣：先脫近護理人員側，再脫遠護理人員側
- ②脫衣：先脫遠護理人員側，再脫近護理人員側
- ③穿衣：先穿遠護理人員側，再穿近護理人員側
- ④穿衣：先穿患側，再穿健側

【3】41.當病人處於發燒極熱期時，護理人員觀察到的症狀不包括下列何者？

- ①皮膚發紅
- ②心跳變快
- ③皮膚冰冷
- ④蛋白尿

【3】42.胸部 X 光節檢屬於文斯樂(Winslow)三段五級健康學說哪一個階段？

- ①第一段第二級特殊防護
- ②第三段第四級限制殘障
- ③第二段第三級早期診斷、適當治療
- ④第一段第一級促進健康

【4】43.有關專家學者對於健康的看法，下列敘述何者錯誤？

- ①羅傑茲(Rogers)強調人與環境能配合即是健康
- ②羅伊(Roy)強調適應良好即表示健康
- ③歐倫(Orem)能成功的處理健康問題，達到自我照顧的狀態即是健康
- ④紐曼(Neuman)健康是正常防禦線的靜態平衡

【3】44.有關影響濕度調節的因素，下列敘述何者錯誤？

- ①最適宜健康的相對濕度為 40~60%
- ②手術室的濕度宜調高，維持在 50~70% 為宜
- ③氣喘及支氣管炎病人濕度必須要低，維持在 10~20% 為宜
- ④空氣太乾燥容易有靜電，容易產生火花

【4】45.有關肌力測量結果，下列敘述何者正確？

- ①測量結果為 1-5 分
- ② 2 分為只有肌肉收縮，無關節運動
- ③ 3 分可以對抗重力及部分阻力下可作全關節運用
- ④ 4 分可以對抗重力及部分阻力下可作全關節運用

【1】46.有關各種臥姿造成壓力性損傷的好發部位，下列敘述何者錯誤？

- ①坐輪椅：坐骨結節、腳跟
- ②側臥時：頭部受壓側、耳朵、肩峰突、肋骨、腸骨嵴、大粗隆、內髌和外髌、踝部
- ③仰臥時：枕骨、肩胛骨、肘關節、脊椎骨突、尾椎骨、腳跟
- ④半坐臥時：肩胛骨、薦骨、腳

【2】47.當病人需要使用坐浴治療時，有關選擇溶液的作用，下列敘述何者不適當？

- ① 1：4000 高錳酸鉀溶液(P.P. solution)：可消腫、防腐、抑菌，促進傷口癒合
- ② 5%硫酸鎂溶液(MgSO₄)：用於痔瘡，有收斂作用
- ③溫水：用於清潔與促進血液循環
- ④ 1：100 優碘(beta-iodine)：用於產後

【3】48.執行病人給藥技術時，若需同時口服多種類的藥物，服藥順序為下列何者？

- ①胃劑→錠劑→滴劑→咳嗽糖漿
- ②錠劑→胃劑→咳嗽糖漿→滴劑
- ③錠劑→滴劑→胃劑→咳嗽糖漿
- ④錠劑→滴劑→咳嗽糖漿→胃劑

【3】49. 有關 NREM 第 3~4 期的生理徵象，下列敘述何者錯誤？

- ①肌肉完全鬆弛
- ②極難被叫醒
- ③胃酸分泌增加
- ④生長激素釋放最多

【1】50.有關壓傷分期，下列敘述何者正確？

- ①第一期：通常位於骨突處，解除壓力 30 分鐘後，發紅情況不會消失
- ②第二期：全組織皮層損傷，可見表淺潰瘍
- ③第三期：全組織皮層損傷，暴露韌帶或肌肉
- ④第四期：傷口底被腐肉或痂皮掩蓋